


¿Qué necesita saber sobre el VSR?



El VSR, o virus sincial respiratorio, es un virus frecuente que se propaga fácilmente mediante estornudos, tos o tacto. Para bebés con ciertas afecciones de salud, el VSR puede causar una enfermedad grave, incluida neumonía o bronquiolitis.

El VSR puede tener síntomas como el resfriado común o la gripe, pero puede tener consecuencias graves. Los niños menores de 1 año son hospitalizados por el VSR **con una frecuencia 16 veces** mayor que por la gripe.

¿Hay algunos bebés con mayor riesgo de enfermedad grave por VSR?

LOS BEBÉS NACIDOS PREMATURAMENTE ESTÁN EN MAYOR RIESGO

Los bebés prematuros nacen con pulmones que son más pequeños y no pueden desarrollarse completamente en comparación con los bebés nacidos a término.

Esto dificulta que los pulmones de los bebés prematuros combatan las infecciones.

¿POR QUÉ LOS PULMONES DE UN BEBÉ PREMATURO SON TAN FRÁGILES?



BEBÉS PREMATUROS

Bebés que nacieron prematuramente (a las 35 semanas o antes) y que tienen 6 meses de edad o menos al inicio de la temporada del VSR.


Los pulmones de los bebés prematuros pueden contener **ALREDEDOR DEL ~50 %** de aire como los de un bebé a término.



93 ml

PULMONES DEL BEBÉ PREMATURO

Bebés nacidos a las 24-35 semanas de edad gestacional



180 ml

PULMONES A TÉRMINO

Bebés nacidos a las 36 semanas de edad gestacional hasta los 3 años

LOS BEBÉS CON CIERTOS PROBLEMAS CARDÍACOS Y PULMONARES TIENEN MAYOR RIESGO



CARDIOPATÍA CONGÉNITA HEMODINÁMICAMENTE SIGNIFICATIVA (O CC-HS)

Bebés con CC-HS con 24 meses de edad o menos al inicio de la temporada del VSR.



DISPLASIA BRONCOPULMONAR/ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA DE LA PREMATURIDAD (DBP/EPCP)

Bebés con BPD/CLDP con 24 meses de edad o menos al inicio de la temporada del VSR

Consulte al médico

si su bebé está en alto riesgo de enfermedad grave por VSR.

¿Puede tomar medidas para ayudar a proteger a su bebé del VSR?



LÁVESE LAS MANOS

Lávese las manos antes de tocar a su bebé y pídale a los demás que hagan lo mismo



NO SE TOQUE LOS OJOS, LA NARIZ NI LA BOCA con las manos sin lavarse



LAVE CON FRECUENCIA LOS JUGUETES, la ropa y la ropa de cama de su bebé



CUBRIRSE LA TOS Y LOS ESTORNUDOS con una tela o con la parte superior de la manga de la camisa



MANTENGA A SU BEBÉ ALEJADO DE LAS MULTITUDES, niños pequeños y evite contacto cercano con personas enfermas

¿QUÉ PUEDE AUMENTAR EL RIESGO DE SU BEBÉ?



TENER HERMANOS EN EDAD PREESCOLAR O ESCOLAR



ASISTIR A GUARDERÍAS



AMBIENTES O ESPACIOS ATESTADOS



EXPOSICIÓN AL TABAQUISMO U OTROS CONTAMINANTES

¿Cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad grave por el VSR?

SI OBSERVA ALGUNO DE ESTOS SIGNOS DE ADVERTENCIA DE LA ENFERMEDAD POR VSR, LLAME AL MÉDICO DE INMEDIATO:

TOS O RESPIRACIÓN SIBILANTE que no se detiene

DIFICULTAD PARA RESPIRAR O AUMENTO DE LA RESPIRACIÓN

FOSAS NASALES ENSANCHADAS Y/O MAYOR HUNDIMIENTO DEL PECHO al tratar de respirar

COLORACIÓN AZULADA alrededor de la boca o de las uñas

FIEBRE, especialmente si es superior a 100.4 °F (rectal) en infantes menores de 3 meses de edad

La mejor defensa de su bebé contra el VSR es USTED.

Hable con su médico si tiene alguna pregunta sobre el VSR o la salud de su bebé.

Para obtener más información sobre el VSR y sobre otros recursos, visite RSVProtection.com



Obtenga más información sobre nosotros en SOBI.com

©2022 Sobi, Inc. Todos los derechos reservados. PP-16878 12/22